

Licena delle paludi

Regno: fauna

Invertebrati

 [lycaenadispar.jpg](#) [1]

Licena delle paludi - *Lycaena dispar*

Specie di medie dimensioni, in cui le femmine generalmente sono più grandi dei maschi, presenta una vivace colorazione differenziata nei due sessi.

La parte superiore dell'ala è arancione brillante con bordatura marrone nei maschi, arancione più tenue e screziata di marrone nelle femmine; la parte inferiore dell'ala posteriore è grigio-azzurro brillante.

Gli adulti si possono osservare in volo da maggio a settembre. Le larve svernanti hanno l'aspetto di Isopodi terrestri, mentre le pupe stanno in genere attaccate alla pianta ospite (*Rumex*) tramite una cintura serica (pupe succinte).

In Italia ha distribuzione centrosettentrionale, ma si ritrova ormai solo in alcune stazioni relitte come il Padule di Fucecchio, nel Padule di Bientina (Tanali e Bottaccio) e le Lame di San Rossore.

La specie è minacciata in tutto l'areale di distribuzione sebbene sia protetta in vari paesi d'Europa. La principale causa della diminuzione delle popolazioni è la totale scomparsa o la riduzione del loro habitat rappresentato da paludi, acquitrini e prati umidi.

Anche la perdita delle tradizionali attività di gestione di questi ambienti con il regolare taglio delle canne ha portato ad un'ulteriore riduzione delle popolazioni: infatti le canne impediscono la crescita di *Rumex* che è la pianta alimentare di questa specie.

In Inghilterra ad esempio la sottospecie *L. dispar dispar* si estinse nel 1850 a causa del prosciugamento delle paludi e della cattura indiscriminata dei collezionisti; gli individui che vi si trovano oggi in alcune paludi appartengono alla sottospecie *L. d. bavatus* introdotta dall'Olanda.

Source URL: <http://zoneumidetoscane.it/it/licena-delle-paludi>

Links:

[1] <http://zoneumidetoscane.it/sites/default/files/lycaenadispar.jpg>