

Ceratofillo comune

Regno: flora

Lamineto

 [cerathophyllum_1.jpg](#) [1]

Ceratofillo comune - *Ceratophyllum demersum*

Pianta acquatica sommersa con fusto sottilissimo (0,5 mm) e flessuoso, ma tenace, lungo fino a due metri, ramificato, privo di radici, liberamente natante o ancorato al fondo per mezzo di germogli incolori.

Foglie verde scuro, verticillate, rigide ma fragili, biforcute una o due volte, dentate e pungenti sul lato esterno.

Fiori maschili e femminili differenziati, ma portati sullo stesso ramo all'ascella delle foglie, entrambi piccoli e poco appariscenti. Il Ceratofillo comune fiorisce da giugno ad agosto e l'impollinazione è idrofila.

La propagazione della pianta avviene soprattutto per via vegetativa e, in caso di condizioni meteorologiche avverse, con produzione di gemme svernanti (ibernacoli).

Questa specie vive in acque stagnanti o lentamente fluenti, ricche di sostanze nutritive e talvolta anche leggermente eutrofizzate, che tendono a riscaldarsi nel periodo estivo.

C. demersum è frequentemente associato alle ninfee ed alle brasche d'acqua.

Le opere di bonifica, di canalizzazione e di drenaggio hanno ridotto notevolmente la presenza di questa idrofita, un tempo largamente diffusa e molto comune nelle acque interne dell'Italia Settentrionale e della Toscana ed ora divenuta abbastanza rara.

Source URL: <http://zoneumidetoscane.it/it/ceratofillo-comune>

Links:

[1] http://zoneumidetoscane.it/sites/default/files/cerathophyllum_1.jpg