La flora

[1]

Il settore settentrionale è costituito da zone umide permanenti circondate da boschi igrofili a prevalenza di Ontano nero (Alnus glutinosa *[2]*) e con altre specie igrofile tipiche della selva planiziaria quali il Frassino ossifillo (*Fraxinus oxycarpa*) ed il Pioppo bianco (Populus alba *[3]*).

La zona meridionale è costituita da ampie depressioni interdunali con vegetazione erbacea dove le piante assumono frequentemente “abito“ succulento nei fusti e nelle foglie.

É il regno delle Chenopodiacee (generi *Salicornia*, Arthrochnemum *[4]*, *Salsola*), delle varie specie di giunchi (*Juncus acutus* e *Juncus maritimus*) e dello Statice (Limonium sp. *[5]*).

Al margine della fascia litoranea si sviluppa il canneto a Phragmites australis *[6]* ed una fascia più ristretta a Canna di ravenna (*Erianthus ravennae*) riconoscibile per le infiorescenze a pannocchia “tipo piuma”.

La vegetazione sull’arenile, compromessa da fenomeni erosivi, conta una sporadica presenza dell’Agropiro (*Agropyron junceum*) rendendo visibile solo le “facies” corrispondenti alla duna ed al retroduna con insediamenti di Sparto pungente (*Ammophyla arenaria*).

La fascia al riparo della duna è caratterizzata dall’*Helichrysum stoechas*, composita a fiori gialli basso-cespugliosa.

Source URL: http://zoneumidetoscane.it/it/le-aree/lame-di-fuori-la-flora

Links:
[1] http://zoneumidetoscane.it/sites/default/files/Componenti/imglame2.jpg

[2] http://zoneumidetoscane.it/it/ontano-nero
[3] http://zoneumidetoscane.it/it/pioppo-bianco-gattice
[4] http://zoneumidetoscane.it/it/salicornia-glauca
[5] http://zoneumidetoscane.it/it/limonio-comune-statice
[6] http://zoneumidetoscane.it/it/cannuccia-di-palude